

Verhalten bei einer beginnenden Schwellung der Atemwege beim HAE



Bei Symptomen einer Schwellung im Hals



Injizieren Sie sofort Ihr HAE-Medikament (Icatibant oder C1-INH).

Bewahren Sie Ruhe!

Begeben Sie sich nach der Injektion unverzüglich in eine medizinische Einrichtung.

Bei beginnender Luftnot, Atemgeräuschen



Rufen Sie den Notruf unter 112

„Ich habe ein Hereditäres Angioödem, eine lebensbedrohliche Erkrankung. Mein Hals schwillt zu, ich bekomme keine Luft.“

Nennen Sie Ihren Namen und Ihren Standort und warten Sie die Antwort ab.



Öffnen Sie die Tür (Zugang ermöglichen).
Informieren Sie Freunde/Nachbarn/Familie.



Injizieren Sie sofort Ihr HAE-Medikament (Icatibant oder C1-INH).



Lassen Sie sich vom Krankenwagen abholen, fahren Sie nicht selbst, lassen Sie sich nicht von Angehörigen/Freunden fahren.



Nehmen Sie Ihre HAE-Medikamente, Schwellungskalender, Befunde und Notfallpass mit.

Eine Schwellung in den oberen Atemwegen kann zu einer lebensbedrohlichen Situation werden. Besonnenes und rechtzeitiges Handeln ist deshalb wichtig.

Wenn Sie schlafen, werden Sie bei beginnender Luftnot automatisch wach, Sie werden nicht im Schlaf durch eine Schwellung ersticken!